MSD
Salud Animal

GUSANO BARRENADOR: Un manejo integral

Más de 42 mil casos acumulados de gusano barrenador en México[1]

Bovinos: +57% casos han sido bovinos la especie más afectada[1]

PREVENIR

Vigilancia en la primera línea de defensa:

EXZOLT 5%

- Revisar diariamente al ganado y detectar heridas.
- Mantener las heridas limpias y protegidas.
- Atender oportunamente cualquier lesión.
- Reportar casos sospechosos.



ERRADICAR

Elimina las larvas:

EXZOLT 5%

- Pour on (derrame dorsal)
- Larga duración
- Su larga acción permite reducir los manejos en el ganado.

EXZOLT 1%

- Vía oral
- Periodo de retiro muy corto de solo 13 hrs.
- Ideal para becerros y vacas de doble propósito.
- No es necesario separar a la cría de la madre

Ambas 100% efectivas contra gusano barrenador (después de 48 hrs)

CURAR

Atender directamente la herida:

MAGOTOX:

- Acción tópica y directa
- Aplicación dentro y alrededor de la lesión
- Su aplicador alcanza larvas profundas
- También ayuda a prevenir nuevas infestaciones

Ideal para:

- Tratar heridas infestadas
- Proteger el ombligo de becerros



UNA ESTRATEGIA, DIFERENTES MOMENTOS



EXZOLT® 5%



EXZOLT® 1%



MAGOTOX®